

CRYOLISSE. Охолоджуючий крем поверхневого застосування.

Інструкція із застосування

Склад:

Лідокаїн - 8%

Прілокаїн - 5%

Бензокаїн - 3%

Бензиловий спирт - 3%

Карбомер 934 - 3%

Лецитин – 3%

Пропілен гліколь – 10%

Токоферолу ацетат – 6%

Вода –59%

Терапевтичний клас:

Місцевий анестетик

Фармакологічна дія:

Крем з лідокаїном тимчасово блокує шлях больових сигналів по нервах. Крем з лідокаїном блокує надходження натрію в нервові закінчення в місці болю. Це запобігає накопиченню електричного сигналу і його проходженню по нервових волокнах до мозку.

Фармакокінетика:

Лідокаїн може абсорбуватися після місцевого введення на слизові оболонки, його швидкість і ступінь всмоктування залежать від конкретного місця застосування, тривалості застосування, концентрації застосування та загальної дози.

Показання:

Призначений для:

Татуювання

Пірсинг

Ін'єкції голками

Лазерне лікування

Воскова епіляція

Увага:

Крем заборонено використовувати, якщо у вас алергія на інші місцеві анестетики (амідного типу)

Ви не повинні наносити цей крем на порізи або рани. Ділянки, де є шкірні висипання або екзема. Не застосовувати на слизових оболонках очей, вух, рота, носа, анусу або до статевих органів.

Побічні ефекти:

Можливі побічні ефекти можуть включати набряк або почервоніння в місці нанесення, незвичайні відчуття на шкірі або блідість шкіри. Важкі або рідкісні побічні ефекти можуть включати алергічні реакції, такі як кропив'янка, висип, свербіж, набряк обличчя та утруднення дихання або стиснення в грудях.

Попередження/застереження:

Застосовувати з обережністю при дефіциті ферменту глюкозо-6-фосфатдегідрогенази; при порушеннях в системі кровотворення, таких як метгемоглобінемія, анемія; у людей, які отримують лікування з приводу тахікардії, аритмії та приймають в зв'язку з цим препарати.

Не рекомендовано використовувати крем-анестетик в одній процедурі з пілінгами. Можливі ускладнення.

Дозування та застосування:

Використовуйте крем з лідокаїном за призначенням лікаря.

Нанесіть CRYOLISSE крем з лідокаїном за допомогою цих простих кроків:

1. Дезінфікуйте необхідну для нанесення ділянку
2. Рівномірно нанесіть необхідну кількість знеболюючого крему на ділянку (ділянка повинна бути сухою)
3. Закрийте поліетиленовою плівкою і тримайте 10-20 хвилин до початку процедури.

Передозування:

Якщо виникли якісь побічні ефекти, і вони вас турбують, негайно припиніть використання та повідомте про це лікаря.

Взаємодія з лікарськими засобами:

Немає відомих взаємодій між цим кремом для місцевого застосування та іншими препаратами. Повідомте свого лікаря про інші засоби для шкіри, які ви використовуєте. Не використовуйте цей крем на тому самому місці, де використовували інші препарати для шкіри.

Упаковка:

Туба

Умови зберігання:

Зберігати при температурі від 5 до 30°C. В захищеному від світла місці. Не заморожувати.