



АЗБУКА
ПРОТОКОЛІВ

КАРТА ПАЦІЄНТА

Алопеція

незалежно від етіології

ОБОВ'ЯЗКОВІ АНАЛІЗИ ДЛЯ ЖІНОК

- Загальний аналіз крові (ЗАК)
- Сироваткове залізо
- Ферритін
- Печінкові проби

Мінеральний склад:

- Кальцій іонізований
- Цинк
- Калій
- Натрій
- Магній
- Вітамін В12
- Вітамін D3

Гормональний статус:

- ТТГ
- АТПО
- АТТГ
- Індекс НОМА
- Глікозований гемоглобін
- Гомоцистеїн
- АсЛО
- Кортизол
- Пролактін
- Індекс св. тестостерону
- 17-ОП
- Прогестерон
- Естрадіол
- ФСГ
- ЛГ
- Андростедіон
- Дегідротестостерон




Гормональний профіль на певні дні циклу:

- ДГЕА-С
- Індекс св. тестостерону
- Прогестерон
- Естрадіол
- Андростедіон
- Дегідротестостерон

Імунологічні дослідження:

- ІgЕ загальний
- ПЛР слини на віруси
 - Епштейн-Барра
 - Цитомегаловірус 6,7,8 типи
 - Герпесів



КАРТА ПАЦІЄНТА

Алопеція

незалежно від етіології

ОБОВ'ЯЗКОВІ АНАЛІЗИ ДЛЯ ЧОЛОВІКІВ

- Загальний аналіз крові (ЗАК)
- Сироваткове залізо
- Ферритін
- Печінкові проби
- Ліпіди фракційно
- Простатоспецифічний фактор

Мінеральний склад:

- Кальцій іонізований
- Цинк
- Калій
- Натрій
- Магній
- Вітамін В12
- Вітамін D3

Гормональний статус:

- ТТГ
- АТПО
- АТТГ
- Індекс НОМА
- Глікозований гемоглобін
- Гомоцистеїн
- АсЛО
- Кортизол
- Пролактін
- Індекс св. тестостерону
- Естрадіол
- ДГЕА-С



Імунологічні дослідження:

- ІgЕ загальний
- ПЛР слини на віруси
 - Епштейн-Барра
 - Цитомегаловірус 6,7,8 типи
 - Герпесів



PlinestHair



PLINEST® HAIR — полінуклеотиди

ПРИЗНАЧЕННЯ

Запобігає випадінню, стимулює ріст і регенерацію, сприяє потовщенню волосся.

Склад:

полінуклеотиди PN НРТ™

Концентрація:

15 мг/ 2 мл

Упаковка

та форма випуску:

попередньо заповнений скляний шприц

Об'єм:

2 мл, 2 голки 30G



Протокол лікування

ФАЗА I

кожні 7-14 днів - 4 сеанси

ФАЗА II


кожні 21-30 днів для наступних 4 сеансів

ТЕХНІКА ІН'ЄКЦІЇ

мікрокрапельно

ЗОНИ ВВЕДЕННЯ

волосиста частина голови, брови



КАРТА ПАЦІЄНТА



Виявлені атрофічні зміни на шкірі у вигляді розтяжок на черевній стінці, спричинені періодом вагітності та швидким приростом маси тіла.



PlinestOne

PLINEST® HAIR — полінуклеотиди

Склад: полінуклеотиди PN НРТ™
Концентрація: 8 мг / 4 мл
Упаковка та форма випуску: ампули 5×4 мл без голки



Протокол лікування

ФАЗА I кожні 7-14 днів - 4 сеанси

ФАЗА II кожні 21-30 днів для наступних 4 сеансів

ТЕХНІКА ІН'ЄКЦІЇ

мікрокрапельно, лінійно-ретроградно (голка)

ЗОНИ ВВЕДЕННЯ шкіра тіла

КАРТА ПАЦІЄНТА



Відзначається порушення епітеліальної цілісності у вигляді пігментованих шрамів на тілі після попередніх травматичних ушкоджень. Також пацієнт відчуває дифузне погіршення тургору та еластичності шкіри в поєднанні з вираженими зморщками.



NewestOne

NEWEST® ONE — полінуклеотиди

Склад: PN НРТ™, ГК, Манітол
Концентрація: 4 мг / 4 мл
Упаковка та форма випуску: ампули 5×4 мл без голки



Протокол лікування

ФАЗА I кожні 7-14 днів - 4 сеанси

ФАЗА II кожні 21-30 днів для наступних 4 сеансів

ТЕХНІКА ІН'ЄКЦІЇ

мікрокрапельно, лінійно-ретроградно (голка)

ЗОНИ ВВЕДЕННЯ шкіра тіла

КАРТА ПАЦІЄНТА

Шкіра стала більш сухою та матовою, з'явилася чутливість до зовнішніх подразників. Втрата пружності та тургору, а також наявність дрібних зморшок в ділянці періорбітальної зони та щік. Спостерігається сухість і лущення шкіри на лобі, щоках і підборідді.



Ialest

IALEST® — гіалуронова кислота

Склад:	ГК
Концентрація:	40 мг / 2 мл
Упаковка та форма випуску:	попередньо заповнений шприц по 2 мл, 2 голки 30G

Протокол лікування

Індивідуальні програми, виходячи з потреб пацієнта

ТЕХНІКА ІН'ЄКЦІЇ

мікрокрапельно, лінійно-ретроградно

ЗОНИ ВВЕДЕННЯ обличчя



БУГОРКОВА ТЕХНІКА





ЛІНІЙНА ТЕХНІКА

під зморшки та армування



АРМУВАННЯ КАНЮЛЕЮ



ПОТОЧКОВО

1. Верхній зовнішній квадрант перетину лінії крило носу – козелок і зовнішній край очниці – кут рота (0,2 мл). При наявності малярного мішку ін'єкція проводиться більш латерально, при його відсутності - медіально.
2. Точка на 1 см латеральніше по скуловій дузі (0,2 мл).
3. Точка на відстані 0,5-1 см від козелка (0,1 мл).
4. Точка проєкції кута нижньої щелепи (0,3 мл).
5. Точка на відрізку продовження підбородкової складки на 2 см латеральніше від центру підборіддя (0,2 мл).



PlinestEye

НЕ ЗАБУВАЄМО ВРАХОВУВАТИ
ПЕРІОРБІТАЛЬНУ ЗОНУ
ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ ПРОЦЕДУР

PLINEST® EYE голка — полінуклеотиди

Склад: полінуклеотиди PN НРТ™
Концентрація: 15 мг / 2 мл
Упаковка та форма випуску: попередньо заповнений шприц
об'єм 2 мл, 2 голки 30G



Протокол лікування

Кожні 14-21 днів 3-4 сеанси

ФАЗА II кожні 21-30 днів для наступних 4 сеансів

ТЕХНІКА ІН'ЄКЦІЇ

мікрокрапельно, лінійно-ретроградно (голка)

ЗОНИ ВВЕДЕННЯ контур очей

КАНЮЛЯ АБО ГОЛКА



КАРТА ПАЦІЄНТА

ТЕКСТУРА ТА ЗВОЛОЖЕНІСТЬ: шкіра суха, матова, чутлива до зовнішніх подразників. Спостерігається лущення на лобі, щоках і підборідді.

ЕЛАСТИЧНІСТЬ ТА ТУРГОР: втрата еластичності, навянність дрібних зморщок в зоні очей та щік.


ПІГМЕНТАЦІЯ: можливі червоні або фіолетові плями куперозу на шкірі.



Newest

NEWEST® — біоревіталізація останнього покоління

Склад:	РН НРТ™, ГК, Манітол
Концентрація:	20мг / 2мл
Упаковка та форма випуску:	попередньо заповнений шприц об'єм 2 мл, 2 голки 30G



Протокол лікування

Кожні 14-21 днів 3-4 сеанси

ТЕХНІКА ІН'ЄКЦІЇ

мікрокрапельно, лінійно-ретроградно (голка)

ЗОНИ ВВЕДЕННЯ обличчя, шия, декольте

КАРТА ПАЦІЄНТА


Наблюдається погіршення текстури шкіри в зоні шиї. Виявлені дрібні зморшки та ознаки втрати пружності шкіри. Крім того, спостерігається сухість шкіри та незначне лущення.



PlinestFast

PLINEST® FAST — полінуклеотиди

Склад:	полінуклеотиди PN НРТ™
Концентрація:	15 мг / 2 мл
Упаковка та форма випуску:	попередньо заповнений шприц об'єм 2 мл, 2 голки 30G



Протокол лікування

кожні 14-21 день 3-4 сеанси

ТЕХНІКА ІН'ЄКЦІЇ

мікрокрапельно, лінійно-ретроградно (голка)

ЗОНИ ВВЕДЕННЯ

чутливі зони (лоб, шия, декольте)

КАРТА ПАЦІЄНТА



ТЕКСТУРА: шкіра обличчя має щільну текстуру з утовщеними ділянками, особливо в зонах рубців.

ЕЛАСТИЧНІСТЬ: шкіра демонструє високу еластичність, характерну для щільної шкіри. Однак в області рубців еластичність може бути трохи зниженою.

ПІГМЕНТАЦІЯ: спостерігається збільшена пігментація в зонах рубців після акне, що створює контраст з навколишньою шкірою.

ЗВОЛОЖЕННЯ: рівень зволоження шкіри середній, проте потрібне додаткове зволоження для запобігання сухості та лущенню.

ПОРИ: можливе помірне розширення пор в зонах з рубцями після акне.

ОЦІНКА ЗАГАЛЬНОГО СТАНУ: шкіра характеризується щільною текстурою, високою еластичністю, нерівномірною пігментацією та середнім рівнем зволоження. Наявність рубців після акне потребує спеціалізованого догляду та професійного лікування для покращення стану шкіри.



Plinest

2 тижні

lalest

2 тижні



Plinest

2 тижні

lalest

2 тижні



Plinest



MAKESKIN у домашній догляд
ОБОВ'ЯЗКОВО як частина терапії

КАРТА ПАЦІЄНТА

ТЕКСТУРА ТА ЕЛАСТИЧНІСТЬ: шкіра обличчя демонструє ознаки деформації та набряку, що характерно для старіння. Текстура шкіри може бути нерівномірною, з наявністю дрібних зморщок і зморщок. Еластичність шкіри знижена через втрату колагену та еластину.



ЗВОЛОЖЕННЯ: шкіра зневоднена, що проявляється у її сухості та втраті еластичності. Спостерігаються ознаки втрати вологи та обезвожування, що підсилює прояви старіння.

ПІГМЕНТАЦІЯ: можливе наявність гіперпігментації або гіпопігментації в різних ділянках обличчя, що може погіршити зовнішній вигляд шкіри та збільшити відчуття старіння.

ПОРИ: розширення пор може бути помітно в зоні лоба, носа та підборіддя через зміни в виділенні себуму та зменшення еластичності шкіри.

НАБРЯК ТА ВІДЕКВАТНІСТЬ: спостерігається схильність до деформації та набряку шкіри, особливо в області очей та щік, що може зусилитися внаслідок неправильного способу життя та недостатнього сну.

ОЦІНКА ЗАГАЛЬНОГО СТАНУ: шкіра обличчя демонструє ознаки старіння, характерні для вікової групи 35+, такі як втрата еластичності, в'ялість, втрата зволоження та нерівномірна текстура.



Plinest

2-3 тижні



Ialrest

2-3 тижні



Plinest

2-3 тижні



Newest

2-3 тижні



Plinest



Не забувайте призначати домашній догляд

КАРТА ПАЦІЄНТА

ТЕКСТУРА ТА ЕЛАСТИЧНІСТЬ: шкіра обличчя має жирну текстуру з можливим блиском, особливо в області Т-зони. Спостерігаються ознаки деформації та набряку, що характерно для типу старіння. Еластичність шкіри знижена через втрату еластину та можливу погіршену структуру колагену.



ЗВОЛОЖЕННЯ: незважаючи на жирний тип шкіри, може спостерігатися зниження рівня зволоження, особливо в зонах, схильних до деформації та набряку. Шкіра може бути обезвоженою через неправильний догляд або вплив зовнішніх факторів.

ПІГМЕНТАЦІЯ: можливі нерівномірні зміни пігментації, такі як гіперпігментація або гіпопігментація, особливо на ділянках з підвищеною секрецією себуму. Це може підсилити візуальне проявлення старіння шкіри.

ПОРИ: жирна шкіра може мати розширені пори, особливо в області Т-зони, що пов'язано з підвищеною секрецією себуму та можливими порушеннями регуляції шкірного жиру.

НАБРЯК ТА ВІДЕКВАТНІСТЬ: деформація та набряк шкіри можуть спостерігатися в зоні скул та підборіддя, що пов'язано з характерними ознаками старіння, а також можливим накопиченням жирових клітин та рідини.

ОЦІНКА ЗАГАЛЬНОГО СТАНУ: шкіра обличчя пацієнта віком 35+ з жирним типом шкіри демонструє ознаки старіння, такі як деформація, набряк, втрата еластичності та нерівномірна текстура.



Plinest

2-3 тижні



Plinest

2-3 тижні



Plinest

2-3 тижні



Newest



Не забувайте призначати домашній догляд

КАРТА ПАЦІЄНТА

ТЕКСТУРА ТА ЕЛАСТИЧНІСТЬ: шкіра обличчя має звичайну текстуру, проте можуть бути виявлені ознаки нерівної текстури в зонах з куперозом. Зазвичай еластичність шкіри зберігається, хоча з віком можливе її невелике зниження.



ЗВОЛОЖЕННЯ: шкіра може бути помірно зволоженою, але деякі ділянки, особливо ті, де виявлений купероз, можуть бути більш сухими і схильними до лущення.

ПІГМЕНТАЦІЯ: на шкірі можуть бути видимі капілярні сітки та плями куперозу, які проявляються як червоні або фіолетові сліди. Це може створювати контраст з навколишньою шкірою та надавати візуальні ознаки старіння.

ПОРИ: розширення пор зазвичай не є характерним для шкіри з куперозом, але у рідкі випадках можуть бути помітні через порушення кровообігу та збільшення судинних мереж.

НАБРЯК ТА НАБУХАННЯ: можливе невелике набрякання шкіри в зонах з куперозом через розширені судини та порушення мікроциркуляції крові.

ОЦІНКА ЗАГАЛЬНОГО СТАНУ: шкіра обличчя пацієнта віком 28+, з ознаками куперозу, характеризується звичайною текстурою та еластичністю, але з виявленими ділянками куперозу, які можуть погіршити зовнішній вигляд та візуальні ознаки старіння.



Plinest

2-3 тижні



Plinest

2-3 тижні



Newest

2-3 тижні



Plinest

ROSADERM®

Крем від куперозу для зміцнення судинної стінки



КАРТА ПАЦІЄНТА

ТЕКСТУРА ТА ЕЛАСТИЧНІСТЬ: шкіра обличчя має звичайну текстуру, але можуть бути виявлені ознаки нерівної текстури в областях з куперозом. Зазвичай еластичність шкіри зберігається, хоча з віком може відбуватися невелике зниження.



ЗВОЛОЖЕННЯ: шкіра може бути помірно зволоженою, але деякі області, особливо ті, де виявлений купероз, можуть бути більш сухими і схильними до лущення.

ПІГМЕНТАЦІЯ: на шкірі можуть бути видимі капілярні сітки та плями куперозу, які проявляються як червоні або фіолетові сліди. Це може створювати контраст з навколишньою шкірою та надавати візуальні ознаки старіння.

ПОРИ: розширення пор зазвичай не є характерним для шкіри з куперозом, але у рідкі випадках можуть бути помітні через порушення кровообігу та збільшення судинних мереж.

НАБРЯК ТА НАБУХАННЯ: можливе невелике набрякання шкіри в областях з куперозом через розширені судини та порушення мікроциркуляції крові.

ОЦІНКА ЗАГАЛЬНОГО СТАНУ: шкіра обличчя пацієнта віком 28+, з ознаками куперозу, характеризується звичайною текстурою та еластичністю, але з виявленими ділянками куперозу, які можуть погіршити зовнішній вигляд та візуальні ознаки старіння.



Newest

2-3 тижні



Plinest

2-3 тижні



Newest

2-3 тижні



Plinest

2-3 тижні



Plinest

ROSADERM®

Крем від куперозу для зміцнення судинної стінки



ДОМАШНІЙ ДОГЛЯД НА ОСНОВІ НУКЛЕОТИДІВ

Обличчя



PLINEST® Care Day Face Cream

Денний крем для обличчя

Нуклеотиди, гіалуронова кислота, вітамін Е, пептид Uplevity™

Крем для біорегенерації шкіри, який уповільнює процеси старіння, забезпечує ефективний захист від вільних радикалів, зменшує зморшки, відновлює еластичність, пружність та сяяння шкіри.



PLINEST® Care Serum

Інтенсивна антивікова сироватка

Нуклеотиди, гіалуронова кислота, вітамін Е, пептид PP7

Біовідновлювальна, «шокова» терапія проти старіння шкіри. Стимулює оновлення клітин, розгладжує зморшки, живить і тонізує шкіру, підвищує тонус та еластичність, має антиоксидантну дію. Застосовується самостійно або в поєднанні з кремами вранці та ввечері.



PLINEST® Care Eye

Гель для омолодження шкіри навколо очей

Нуклеотиди, гіалуронова кислота, вітамін Е, Eyedeline™ (екстракт планктону)

Має інтенсивну зволожувальну, антивікову дію, блокує вплив вільних радикалів на шкіру, зменшує набрякність, усуває темні кола під очима.



PLINEST® Care Day Face Cream SPF20

Денний крем для обличчя з SPF 20

Нуклеотиди, гіалуронова кислота, вітамін Е, Thiostim®

Зменшує зморшки, відновлює еластичність, пружність та сяяння шкіри, захищає від сонячного випромінювання. Під час регулярного використання сприяє уповільненню фото- і хроностаріння шкіри.

КОСМЕТИЧНІ ЗАСОБИ ДЛЯ ДОМАШНЬОГО ДОГЛЯДУ ЗА ОБЛИЧЧЯМ ТА ТІЛОМ

Обличчя



PLINEST®
Care Night
Face Cream

Нічний крем для обличчя

Нуклеотиди, гіалуронова кислота,
вітамін Е, пептид Juveleven™

Крем для біорегенерації шкіри,
який уповільнює процеси
старіння, сприяє регенерації
клітин та запобігає руйнуванню
колагену. Ефективно зволожує
шкіру, відновлює тонус та елас-
тичність.



Turnover® Cream
biorevitalization
posttreatment

Крем для відновлення шкіри

Нуклеотиди натурального походження

Нуклеотиди, що входять до скла-
ду крему, глибоко зволожують,
пом'якшують шкіру, мають дер-
мопластичні та регенеративні
властивості, які сприяють швид-
кому процесу епітелізації. Крем
можна застосовувати після про-
фесійних естетичних процедур:
хімічний пілінг, біоревіталізація,
біорепарація, контурна пластика,
радіочастотна терапія тощо, щоб
допомогти відновити функціо-
нальні особливості шкіри. Засто-
совувати 2-3 рази на день.



Rosaderm®

Крем для відновлення шкіри та зміцнення стінок судин

Нуклеотиди, гіалуронова кислота,
вітамін Е, бісаболол

Помітно зменшує прояви
куперозу та розацеа,
заспокоює чутливу шкіру,
знижує реактивність судин.
Відновлює і зволожує шкіру,
усуває запалення та має
антиоксидантні властивості.
Застосовується 2 рази на день
вранці та ввечері.



Makeskin®

Крем для регенерації шкіри і терапії рубців

Нуклеотиди, гіалуронова кислота,
вітамін Е, екстракт цибулі

Запобігає утворенню келоїдних
та гіпертрофічних рубців, віднов-
лює еластичність і тонус шкіри.
Покращує фізіологічні, репара-
тивні властивості шкіри, посилює
захист від вільних радикалів.
Makeskin® мінімізує рубцеві
зміни шкіри, зумовлені хірургіч-
ними втручаннями, травмами та
опіками. Застосовувати відразу
після зняття швів 2 рази на день.

ДОМАШНІЙ ДОГЛЯД НА ОСНОВІ НУКЛЕОТИДІВ

Тіло



PLINEST® Care Firming Body Cream

Крем для зміцнення шкіри тіла

Нуклеотиди, гіалуронова кислота,
вітамін Е, олія жожоба

Стимулює синтез колагену,
підвищує пружність та еластич-
ність шкіри, має антиоксидант-
ну дію. Ефективно зволожує та
пом'якшує шкіру.



PLINEST® Care IN biorevitalization tablets

Препарат для внутрішньої біоревіталізації

Нуклеотиди, вітамін С, гіалуронова
кислота, вітамін Е, коензим Q, цинк,
фолієва кислота

Стимулює обмінні процеси
в організмі, забезпечує підвище-
ний синтез гіалуронової кислоти
та колагену, надає антиоксидант-
ний захист. Покращує тургор
та еластичність шкіри, запобігає
появі пігментних плям. Реко-
мендовано під час проведення
процедур біоревіталізації
та стимуляції синтезу колагену,
для посилення результату від
ін'єкційних процедур.



PLINEST® Care Concentrated Serum

Концентрована антицелюлітна сироватка

Нуклеотиди, гіалуронова кислота,
вітамін Е, кофеїн, есцин, екстракт
листя лотоса горіхоносного

Ефективно бореться з такими
естетичними недоліками, як
ефект «апельсинової кірки»,
сприяє зменшенню локальних
жирових відкладень, ущільнен-
ню та гладкості шкіри. Сироват-
ка має приємну текстуру, швид-
ко поглинається, залишаючи
відчуття гладкої та зволоженої
шкіри.


УВАГА!

Вищевказаний протокол носить рекомендований характер. Хоча препарати, зазначені в протоколі, зазвичай безпечні, завжди важливо знати інформацію про препарати згідно інструкції. Косметолог повинний знати про місцеві ускладнення. Косметологу необхідно бути знайомим із застосуванням препаратів як за призначенням, так і не за призначенням, щоб забезпечити пацієнтам відповідний ефект і знизити пов'язані з ними негативні наслідки.

Клінічна ефективність препаратів при застосуванні не за призначенням, а також будь-які потенційні довгострокові проблеми безпеки повинні оцінюватися за допомогою добре спланованої тактики проведення процедури.

Косметолог повинен вибрати спосіб застосування та дози, тактику введення препаратів, у відповідності до алгоритму проведення процедури на підставі різних факторів, виявлених на підставі даних отриманих від пацієнта, примаючи до уваги можливі побочні реакції та очікуваний результат, строго спираючись на інструкції, що додаються до препаратів, які використовуються у процедурі.

Процедури підбираються індивідуально кожному пацієнту. Відповідну тактику слід обирати залежно від стану пацієнта та його цілей. Косметолог несе повну відповідальність за обрану тактику та результати проведення процедури.





Дистриб'ютор в Україні
TOTIS Pharma

0 800 20 15 15
www.totispharma.com

