PLINEST® *One*

Гель для внутридермального введения на основе полинуклеотидов для лица и тела
8 мг/4 мл

ОПИСАНИЕ ПРЕПАРАТА:

PLINEST®One - медицинское средство 3-го класса. В каждой ампуле по 4 мл содержится 8 мг ПДРН. PLINEST®One - жидкий гель на основе полинуклеотидов для внутридермального введения. Стерильный, апирогенный гель одноразового использования. Полинуклеотиды - вещества натурального происхождения, получаемые из рыбного сырья, высокоочищенные и реабсорбируемые. Обладают увлажняющими свойствами и оказывают трофическое действие на фибробласты, содействуя таким образом улучшению эластичности и тонуса кожи всего тела.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:

Благодаря биохимическим свойствам препарат PLINEST®One оказывает увлажняющее и трофическое действие. Препарат применяется в основном в целях улучшения тургора, эластичности и тонуса кожи всего тела. В рамках протоколов проведения процедур, подобранных врачом индивидуально для пациента, данное воздействие также способствует восстановлению контуров кожи на таких участках с высокофиброзным компонентом, как, например, стрии и западающие рубцовые поражения. PLINEST®One может использоваться на любом участке кожи тела и лица. Однако, с учетом объема 4 мл в каждой ампуле и низкой концентрации препарата (2мл/мг) рекомендуется его применять на широких участках тела (живот, ягодицы, бедра, руки, зона декольте).

СОСТАВ:

Каждая ампула содержит 4 мл жидкого изотонического геля, состоящего из: полинуклеотидов 2 мг/мл, воды для инъекционных препаратов, хлорида натрия, натрия одноосновного фосфата дигидрата, натрия двухосновного фосфата додекагидрата. Раствор, содержащийся в ампуле, стерильный и апирогенный.

МЕТОДИКА ПРИМЕНЕНИЯ:

PLINEST®One вводится при помощи стерильных шприцев. Размер иглы выбирается врачом, осуществляющим инъекцию. Рекомендуется использовать тонкую иглу (обычно 30 G), чтобы снизить дискомфорт пациента во время процедуры. Раствор готов к применению и вводится интрадермально. В зависимости от оценки врача возможно применение разных видов техники введения: линейной, техникой единичных вколов (классической), решеткой, веерной. PLINEST®One также может вводиться неинвазивными методами (ионофорез, электропорация, гидроэлектрофорез и др.). В этих случаях, перед введением препарата необходимо продезинфицировать обрабатываемый участок кожи спиртом или другим антисептиком, а затем смыть дезинфицирующее средство стерильным физиологическим раствором. Рекомендуется проводить программы процедур, индивидуально подобранные в соответствии с состоянием кожи и потребностью пациента.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:

Применение препарата PLINEST®One противопоказано у пациентов с установленной повышенной чувствительностью к компонентам препарата или с аллергией, в анамнезе, на препараты рыбного происхождения. У пациентов с аутоиммунными заболеваниями, у беременных и кормящих грудью женщин и у пациентов моложе 18 лет не рекомендуется применение препарата PLINEST®One из-за отсутствия клинических данных по его использованию.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

Препарат не показан к применению в том случае, если инъекция не выполняется внутридермально. Придерживаться принятых мер предосторожности, предусмотренных в случае внутридермальной инъекции: не следует вводить PLINEST®One в анатомические зоны при наличии в них инфекции, дерматита или воспалительного процесса. Перед началом процедуры собрать подробный анамнез. В случае пациентов, которые ранее прошли процедуры с применением наполнителя, убедиться в полном восстановлении физиологического состояния кожи. Пациент должен сократить до минимума воздействие на зону инъекции интенсивных солнечных лучей или сильного холода. Как и при других внутрикожных инъекциях внутридермальное введение препарата PLINEST®One связано с риском инфекции. В связи с этим, рекомендуется очень тщательно промыть и продезинфицировать обрабатываемый участок кожи.

ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ ДИСТРИБЬЮТОР В УКРАИНЕ TOTIS PHARMA

094 855 15 15